

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε ατμούς. • Όταν φοράτε προστατευτικά γάντια. • Καλύψτε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΛΗ-ΘΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. • Διάδωθε το περιεχόμενο/περίεκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Να φοράτε κατάλληλη μάσκα (FFP2) κατά την διάρκεια της ανάμιξης/ φόρτωσης και εφαρμογής. • Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. • Η εφαρμογή σε αποπνικτικές θα πρέπει να γίνεται μόνο με τραπέζι ερδωμένο με κλειστή καμινάδα. • Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει. • Να περιμένετε 5 και 24 ημέρες, μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε σε αποπνικτικές επιδρομές για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρησης αντίστοιχα. • Να περιμένετε 2 και 14 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στον ελαιώνα για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρησης αντίστοιχα. • Να περιμένετε 5 μέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στην καλλιέργεια με καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και συγκομιδή. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: • Σε κάθε περίπτωση η μελισσοκομία της περιοχής θα πρέπει να αποδομηθεί πριν την εφαρμογή. • Για την εφαρμογή σε ελαιώνες θα πρέπει να τηρείται απόσταση (ζώνη τούλκων) 5 μ. **ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΥΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ασυμπτωτικής ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα του θύματος αμέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν οσος από να κάνει μετά τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Πότε μη προκαλέσει εμετό ή δώσει τίποτα από το στόμα σε άτομο που είναι αναίσθητο ή έχει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. **Οδηγίες για το γιατρό:** το Dimethoate είναι αναστολέας της χολινεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα προκαλώντας αναπνευστική καταστολή. **Μεταχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας:** απαιτείται διαδικασία απολύμανσης όπως πλύση όλου του σώματος, πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.

Αντίδοτο: Αν υπάρχουν συμπτώματα, χορηγήστε atropine sulphate σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5-10 λεπτά έως τα συμπτώματα απορροπούν να εμφανισθούν και διατηρήστε τον πληθυσμό αντιτοξικό έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό μεταβολισθεί. Συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθεί atropine chloride (Toxogonin®) ή ενδοφλέβια 2-mercaptoethanol (2-PAM). Οι όμως σαν αντικαταστάτης του atropine sulphate. Η χορήγηση με οξίμη μπορεί να συνεχισθεί όσο χορηγείται atropine sulphate. Στα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οίδηματος, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να μεταφερθεί νοσηλευστικά. Για να αποφευχθεί πιθανή υποπνοή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΛΗΘΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7737777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΙΣ ΣΚΕΥΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επικοινωνία ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέσως ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αμέσως ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τους σπαργάνες.

Επικοινωνήστε με τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνων μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε όλα τα άνθη ανθοφόρων φυτών (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, ζιζανίων ή ανθοφόρων φυτών σε φυτοφράκτες). Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι πρέπει να ενημερωθούν για τις επικείμενες εφαρμογές.



Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Αριθμ. Έγκρ. Κυκλ.:
14413/25-2-2013

Εγγυημένη σύνθεση:

Dimethoate: 40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 61,1% β/β

**ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης
και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Τοξικό για τις μέλισσες.



Κάτοχος της έγκρισης: **HEADLAND AGROCHEMICALS LTD.,**
Rectors Lane, Pentre, Deeside, CH5 2DH, Hw. Βοσάλειο.

Παρασκευαστής: **Chemimova A/S, Δανία.**

HAGROLOGY
εφαρμογές σύστημα διαχείρισης
σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001, ISO 14001 &
ELOT 1801/OHSAS 18001

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά, Διανομή: **AGROLOGY ABBE**
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 1089, 57022 Σίνδος
Τηλ: 2311 998.600 | Fax: 2311 998.601
e-mail: info@agrology.eu | www.agrology.eu

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορρόφησης. β) Γαλακτωματικό ψεκασμό μικρού όγκου από αέριον.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: α) Για τους ψεκασμούς φυλλώματος γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. β) Για την διάλυση ψεκαστικού υγρού: πλύνω τον ανωτέρω προσδωμένο και την ελαστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διάλυσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η αναδευση πρέπει να είναι εντονότερη. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζω τελείως τον ψεκαστήρα. Πλύνετε οριστικά το βύθιο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κρύο απορρυπαντικό από αεροφόριος όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Αφαιρέστε όλες τις απορρίψεις πουρολάδες στον καθαρισμό του ψεκαστικού μηχανήματος. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό με μη ριγμένο τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδρότινους πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΕΙΑΣ: Οι φάσεις ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προκειμένου να τριπλύνει, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέψετε όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΛΕΓΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με βορζολόγιο πατό και αλκαλικό σκευασμα ή σκευασμα που περιέχουν θειάφι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και προστατευτικό προσώπου. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστική ράμπα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και ανθεκτικά παπούτσια. Κατά την εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια και σε περίπτωση οχημάτων χωρίς καμινάδα, επιπρόσθετα κάλυμμα κεφαλής και προσώπου και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. Η επανεισόδου στον ψεκασμένο χώρο να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Αποφύγετε την έκθεση του σώματος και φορέστε φάρμα ερσής και γάντια. Κατά την εφαρμογή με ψεκαστικό σπρέι: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, πλατύχωρο καπέλο και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία Παρασκευής:

Ημερομηνία Λήξης: **Βλέπε συσκευασία**

Αριθμός Παρτίδας:

Περιεχόμενο: 1 λίτρο



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής/Στόχοι/Δοσολογία/Τρόπος, Χρόνος εφαρμογής και μεσοδιάστημα εφαρμογής/Συνθήκες αρθ. εφαρμογής ανά καλλιέργεια/περίοδο)

ΕΣΤΙΝ ΕΙΣΑΓΕΙΝΕΙ: **Παρασκευαστής:** **Headland Agrochemicals Ltd.** **Αφίδια (Aphis spiraecola spm. Aphis citricola):** 1ος ψεκασμός στο τέλος της άνοιξης και ο 2ος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρού (καρπός να είναι πρόσφατο). Δόση: 100-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 120 λίτρα/ στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **2. Ελιά (Diospyros):** **Βακτροσφα (Bactroscopa oleae):** **1. Δοσολογία ψεκασμού** σε συνδυασμό με εγκυμονούν εντομοκτονικό. Δόση: 625 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 12,5 κ.εκ./στρ. (200 ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο σε 10 δένδρα/στρ). Όγκος ψεκ. υγρού: 2 λίτρα/ στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **4** που μπορεί να αυσιναστεί με ένα ψεκασμό καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. **2. Ψεκασμοί καλύψεως:** Αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή. Δόση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 120 λίτρα/ στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.** **Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ακακάνια (εσολογία):** **Αφίδια (Thrips tabaci):** Με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **2 με μεσοδιάστημα 14-14 ημέρες.** **Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθριο):** **Αφίδια (Aphis gossypii, Aphis spm. Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae):** Με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες.** **ΣΠΗΡΑ:** **Σπύρι, Σκόλη, Τριπλάκη, Σκόλη σπύρι:** **Αφίδια (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum):** Με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **1. ΚΑΛΛΙΝΕΣΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΟ) και Θερμοκίττα:** **Αφίδια (Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis hederiae, Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Macrosiphonellia sanborni):** Με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αρθ. εφαρμογής ανά καλ/κή περίοδο: **2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. **2.** Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να απορροφάται από τις ταμίες. **3.** Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανική Κεράμνη. **4.** Αιτιώμενες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κοναρβόλη. **5.** Δοσολογία ψεκασμού μικρού όγκου (LV) από το έδαφος, Αρχίζουν συνήθως λίγες Ιουλιού αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δοκιμασιών, των καταρτίσεων ακαμιών και των αποτελεσμάτων των δειγματολημμένων ελαιόκαρπων. Ποσότητα δόλωσης 2 λίτρα/στρέμμα. **6.** Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η πληθυσμιακή των αφίδων μπορεί να παράγουν μελίττα. **8.** Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση. **9.** Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται οι επόμενες ημέρες βροχόπτωσης. **10.** Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αρχά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυμμές τους για μια μέρα εξασφαλισμένη τροφή και νερό εντός της κυμλής ή να απομακρυνθούν οι κυμμές.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Επεριδοίδη: 120 ημέρες. Ελιά: 28 ημέρες. Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ακακάνια: 14 ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα: 21 ημέρες. Καρότο, Πατάκη, ρίζες. Μαϊντανό: 35 ημέρες. Ζαχαροκάλαμο, Πατάκη, Γογγύλη: 28 ημέρες. Σπύρι: Τέλος άνοιξης. Καλλιμασκή: Δεν έχει εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: α) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές μέθοδοι προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στον ελάχιστο απαιτούμενο για αποτελεσματικό έλεγχο. **2.** Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις αναπνευστικές δόσεις και χρόνο εφαρμογής και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος. **3.** Να ψεκάζεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο (με βάση το κατάφυτο επικινδυνότητα (έναν ύπαρξη) και με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιμους οργανισμούς). **4.** Να γίνεται επιπλέον της ευαισθησίας των πληθυσμών. Να αποφευχθεί την επικολοχική χρήση σκευασμάτων που περιέχουν dimethoate και να εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδες με διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι υπερβίβες) και τα καρβωλικά σκευασματά που έχουν διείσδυση ανθεκτικότητα με το οργανοφωσφορικό όπως τα οργανοφωσφορικά. Το σκεύασμα δεν πρέπει να αναμειγνύεται με Βορδολιγία Πολύ, αλκαλική σκευασματά ή σκευασματά που περιέχουν θειάφι.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι δυνατόν να εμφανισθούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες τομάτας. Να αποφευχθεί η αύξηση της συγκέντρωσης στην τομάτα. Προκαλεί φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Λιανική Κεράμνη». Αιτιώμενες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Κοναρβόλη». Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά: *Adiantum, Aralia Sieboldii, Asparagus plumosus, Begonia multiflora, Coleus hybridus, Calceolaria glauca, Chrysanthemum indicum, Cissus antarctica, Ficus pandurata, Nephrolepis, Sanchezia, Sinningia speciosa, Gloxinia, Pteris (tremula, ensiformis, evergreenis), Salvia splendens.* Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS, στο χρυσάνθεμα και στην αζαλέα. Μπορεί να προκαλέσει σκωρίαση σε μερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πευκοκοκκουριά. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να τηρηθείται δοκιμαστική εφαρμογή στο με μικρή κλίμακα. Να μην εφαρμόζονται σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νερού, πάγο ή ζέση από ζέλιονακία). Να μην εφαρμόζονται αν αναμένεται βροχή ή παγετός.



www.agrology.eu